

Цілковите виліченє вовка (lupus) за помічю Kalium hypermanganicum.

Подав: Др Володимир Янович

б. асистент ц. к. шпиталю на Віденю у Відни.

Антін Кулинич, селянин з Виспи, рогатинського повіту, прийшов до мене в січні с. р. кажучи, що вго наймит вирізав єму був нечистим ножиком бородавку на карку, з чого витворила ся рана. Та рана, зразу мала, побільшала ся чим раз більше, а тепер займає вже чи не цілий карк, не вважаючи на те, що недужий вже не раз удавав ся до лікарів о поміч, котрі по при ріжнородні масти випікали зхоріле місце ріжними їдкими течами.

Диягноза, вовк (lupus).

Я предприняв сейчас excochleatio, котра не вінчала ся пожаданим успіхом, бо з виїмком малих частин, котрі перемінили ся в близну, лишив ся вовк як передше. Друга операція (excochleatio) скінчила ся рівнож безуспішно. Тоді став я вго лічити методом Др Качановського за помічю Kalium hypermanganicum.

Сей метод (гл. Semaine médicale), котрий Др Качановський з добрим успіхом примінив до 34 пацієнтів з вовком від року 1878, полягає на тім, що посипує ся грубою верствою на 2 — 5^{mm} порошком з Kalium hypermanganicum місця заняті lupus-ом. Струпи, коли які є, усуває ся наперед. Поверх верстви Kalium hypermanganicum приходить бавовна і перевязка. Та опаска лишає ся так довго, доки вона не пересякне цілком, почім здимає ся її і заступає звичайним антисептичним бандажом т. є. поступає ся далі так, як зі звичайною раною — бо після Др Качановського вистарчає одинокий раз посипати вовка порошком з Kalium hypermanganicum, щоби всі губчасті маси (Fungöse Wucherungen) вовка цілковито знищити. В моім случаю не вистарчило одиноке посипанє

сим порошком до цілковитого знищення вовком зайятих місць — чи то ддятого, що lupus займав велику просторонь чи то ддя того, що уровень ьго не був гладкий а мав ріжні горбки і заглибленя, так що Kalium hypermanganicum мабуть не на всі місця однаково припало, противно я мусїв кілька разів повтаряти сю процедуру.

Пацієнт терпить великий біль під Kalium hypermanganicum, одначе все таки сей біль не рівнає ся тому, який ся завдає хорму через exscholeatio або і навіть через часте кавтеризованє ідкими течами, а ліченє за помочю Kalium hypermanganicum має те за собою, що скорше і певнійше веде до виліченя вовка

А. Кулинич, був в протягу 4-ох тижднів від першого перевязаня цілком здоров. Від того часу, а в тому вже більше як $\frac{1}{2}$ року, видів я ьго вже кілька разів; на місци давного вовка звичайна близна.